



DOI: <http://dx.doi.org/10.21270/archi.v7i0.3910>

GLOSSITE ROMBOIDE MEDIANA: RELATO DE CASO CLÍNICO

FERRIOLLI, S. C. (UNESP - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"); FERNANDES, T. (FOA - Faculdade de Odontologia de Araçatuba); TOMO, S. (FOA - Faculdade de Odontologia de Araçatuba); BERNABÉ, D. G. (FOA - Faculdade de Odontologia de Araçatuba); ISSAMU MIYAHARA, G. (FOA - Faculdade de Odontologia de Araçatuba).

Tema: Clínica Odontológica

A glossite romboide mediana é uma doença inflamatória que ocorre em dorso de língua, na região anterior as papilas circunvaladas, com etiologia desconhecida. Antigamente, acreditava-se que existia uma relação com a embriogênese imperfeita, porém a infecção por *Candida albicans* pode estar associada. Apresenta-se clinicamente como uma placa variando de branca a avermelhada, plana ou elevada, com contornos ovalados ou romboides; limites nítidos; superfície lisa, nodular ou fissurada; não passível de remoção por raspagem; sem características de malignidade, podendo apresentar discreta sintomatologia dolorosa. Este trabalho tem por objetivo apresentar o caso clínico de um paciente de 44 anos, com queixa de alteração de textura na região mediana da língua, discreta sintomatologia dolorosa e alteração de paladar ao ingerir alimentos ácidos ou picantes. Clinicamente, apresenta placa eritematosa não removida por raspagem, com contornos romboides e nítidos. Dado o diagnóstico de glossite romboide mediana e com base na literatura, o tratamento eleito foi a orientação de higiene oral ao paciente e prescrição de bochechos com Nistatina, resultando em regressão parcial do quadro. A partir disto foi possível concluir que ainda são necessários mais estudos a respeito da eficácia da Nistatina, abordando fatores etiológicos, diagnóstico diferencial e tratamento sobre glossite rombóide mediana.

Descritores: Etiologia; Glossite; Nistatina.