



PACIENTES COM DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR SÃO CATASTRÓFICOS?

Danielle da Silva Guimarães, Giovani Maciel de Souza Filho, Sara Luiz de Souza Bitu, Rachel Christina de Queiroz Pinheiro, Ana Carolina Loureiro Gama Mota
danielle_guimaraes13@hotmail.com

Centro Universitário de João Pessoa, UNIPÊ, João Pessoa, PB

Categoria: Pesquisa

Introdução: DTM é um termo coletivo que designa uma síndrome dolorosa musculoesquelética que acomete os músculos mastigatórios, a articulação temporo mandibular (ATM) e estruturas associadas. O estresse e o excesso de trabalho podem atuar como fatores de risco no desenvolvimento da DTM. A catastrofização é vista como uma forma exagerada de prever o futuro de forma negativa, ou seja, o indivíduo prevê determinada situação de forma negativa e com a ideia de que não irá suportar determinada situação. **Objetivo:** Dessa forma, o objetivo da presente pesquisa foi avaliar a relação DTM e catastrofização, em que essa apresenta ser o mais corriqueiro e maior grau de catastrofização. **Metodologia:** Para isso, foi usado um formulário de Avaliação Muscular e outro da PCS, como critérios de inclusão tivemos prontuários de pacientes atendidos pelo curso de DTM na COESP; pacientes maiores de 18 anos de ambos os sexos; e como critério de exclusão prontuários que estiveram rasurados e com preenchimento incompleto. **Resultados:** Sendo assim, mais de 45% dos resultados em relação a catastrofização os pacientes relataram nunca pensar continuamente noutras situações dolorosas. **Conclusão:** Todos os pacientes que responderam os questionários sentem dor, entretanto, sobre a dor relacionada à dor catastrófica foi visto que não são catastróficos e a maioria dos participantes relatou sentir dor muscular (DTM muscular), sendo a maior incidência no sexo feminino, na faixa etária de 35 anos.

Descritores: Transtornos da Articulação Temporomandibular; Catastrofização; Dor.