

FATORES ASSOCIADOS À CÁRIE DENTÁRIA NA PRIMEIRA INFÂNCIA

Maria Luísa de Assis Braga, Estéfany Louise Pereira, Júlia Tavares Palmeira, Luciana Ellen Dantas Costa, Maria Clara Braga Maia, Ocimar Lopes de Oliveira, Faldryene de Sousa Queiroz
marialuisaabraga@hotmail.com

Introdução: A cárie dentária caracteriza-se como uma doença infectocontagiosa, de caráter multifatorial, que se não tratada resulta na destruição dos tecidos dentais. Entre os fatores que estão associados ao desenvolvimento da doença cárie, podemos destacar a dieta, higiene oral e, em crianças jovens, a não adesão dos responsáveis aos métodos preventivos. **Objetivo:** O presente estudo teve como objetivo analisar a associação entre cárie dentária, hábitos alimentares e de higiene e a percepção dos pais sobre saúde bucal de crianças na faixa etária de 5 anos de idade do município de Patos-PB. **Metodologia:** A pesquisa foi realizada com 243 crianças de 5 anos de idade, matriculadas em creches públicas do município de Patos/PB e seus respectivos pais/responsáveis. Para a coleta dos dados utilizou-se os índices IHOS e ceo-d, e aplicou-se questionários aos pais avaliando hábitos alimentares e de higiene e sua percepção sobre saúde bucal. Para avaliar a associação entre a cárie dentária e os fatores associados utilizou-se o teste do Qui-Quadrado ($p < 0,05$). **Resultados:** O índice ceo-d médio foi de 3,11. Houve a associação significativa entre a cárie e o índice de higiene oral ($p = 0,016$), uso da mamadeira ($p = 0,016$) e a percepção dos pais se a cárie é transmissível ($p = 0,003$). **Conclusão:** É alta a prevalência de cárie em pré-escolares do município de Patos-PB e os hábitos alimentares, de higiene bucal, bem como o conhecimento dos cuidadores sobre o tema, podem influenciar diretamente no aparecimento da doença.