



DOI: <http://dx.doi.org/10.21270/archi.v7i0.3910>

TRATAMENTO DE UMA LUXAÇÃO LATERAL ASSOCIADA À EXTRUSÃO EM DENTE DECÍDUO: RELATO DE CASO

SAKAMOTO, A. E. (UNESP - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"); CUNHA, R. F. (UNESP - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"); NAGATA, M. E. (UNESP - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"); SAMPAIO, C. (FOA - Faculdade de Odontologia de Araçatuba)

Tema: Clínica Odontológica

O trauma em criança do tipo luxação representa 57% dos casos de trauma, envolvendo principalmente dentes decíduos anteriores superiores, e geralmente são causados por quedas dentro de casa. Na luxação, os tratamentos propostos podem variar desde o reposicionamento imediato do dente luxado até a extração, ou apenas a realização de acompanhamento clínico e radiográfico. Paciente de 5 anos de idade, saudável, apresentou-se à clínica de Odontopediatria da Faculdade de Odontologia de Araçatuba (UNESP) imediatamente após sofrer traumatismo de luxação lateral e extrusão no dente 61. O dente foi reposicionado e realizada a contenção. Após 21 dias foi removida a contenção. O paciente foi acompanhado até a exfoliação normal do dente traumatizado e erupção do permanente sucessor. Concluiu-se que em casos de atendimento imediato a reposição e a fixação são indicadas como melhor tratamento para dentes decíduos luxados.

Descritores: Traumatismos Dentários; Luxação Dentária; Criança.