



DOI: <http://dx.doi.org/10.21270/archi.v6i0.2255>

DCCI-009

Características clínicas do fumante invertido: relato de 2 casos clínicos

Castellanos-Garcia MB, Moncada-Herazo CA, Enamorado-Guerra RJ, Hoyos-Estrada LD, Martínez-Mendoza MA, Rodríguez-Sánchez MP

Área: Propedêutica

O hábito de fumar invertido é pouco comum, mas ainda se apresenta em países como a Índia, Panamá, Venezuela e Colômbia. No município de Lorica – Córdoba – Colômbia localizado na região norte da Colômbia há uma comunidade de classe baixa que ainda apresenta este hábito. O cigarro é colocado com a candela para dentro da boca e o calor dos produtos do fumo gerado dentro da boca e a combustão do cigarro são os fatores predisponentes para o desenvolvimento de lesões no palato, a língua e as mucosas, é de desenvolvimento crônico. O hábito de fumar invertido está relacionado com o desenvolvimento crônico de estomatite nicotínica que é uma lesão que se apresenta no palato dos fumadores invertidos, o hábito também está relacionado com o alto risco de desenvolver lesões pré-malignas, o que aumenta significativamente o risco de conversão a lesão maligna. Assim, pacientes de 55 e 57 anos de idade, do gênero feminino, melanodermas, comparecem à Clínica Odontológica Juan Manuel Méndez Bechara da Universidad del Sinú-Colômbia, procedentes do município de Lorica para tratamento odontológico. As pacientes não apresentavam doenças sistêmicas, porém relatavam história de fumar com a candela para dentro da boca desde os 14 e 15 anos de idade. Ao exame clínico observou-se no palato duro placas queratóticas que não desprendiam ao raspado, áreas pigmentadas ao redor dos ductos das glândulas salivares menores do palato, pontos vermelhos além de fissuras. Nos dentes superiores observaram-se manchas nicotínicas nas faces palatinas, áreas brancas, compatíveis com leucoplasia, nas mucosas dos lábios e bochechas e pigmentação lingual. Elas relatavam não ter conhecimento prévio do risco que apresentam devido ao hábito, no quesito desenvolvimento de lesões pré-malignas e malignas. Portanto, o hábito de fumar invertido ainda está presente em localidades de classe pobre do município de Lorica-Colômbia, e não existe conhecimento nestas comunidades dos riscos que correm com a continuidade do hábito.

Descritores: Estomatite; Tabaco; Nicotina; Transtorno por Uso de Nicotina.