



DOI: <http://dx.doi.org/10.21270/archi.v6i0.2255>

PCCL-013

Necrose lingual após sutura de extensa laceração

Salata JS, Momesso GAC, Lima VN, Souza CA, Nunes FLC, Polo TOB, Magro-Filho O, Faverani LP

Os ferimentos intraorais acometem o sistema estomatognático gerando ao paciente dificuldades mastigação e fonação principalmente quando afetam a língua. Neste contexto, a qualidade da sutura e os cuidados locais são fundamentais para recuperação adequada e o retorno mais breve do paciente as suas funções normais. Paciente do gênero masculino, melanodermo, procurou o serviço de Cirurgia Bucocomaxilofacial relatando ter sido vítima de acidente automobilístico com presença de laceração extensa na língua e que estava suturada há uma semana. Entretanto, o mesmo queixava-se de dor, gosto desagradável e odor na região do ápice lingual. Após o exame físico notou-se presença de tecido necrótico e deiscência da sutura. Dessa forma, foi realizada a anestesia local com lidocaína 2% e epinefrina 1:100.000 seguida de desbridamento e sutura com pontos internos e externos ao ferimento com fio vicryl plus 4-0. Durante o acompanhamento após tratamento não foi observado sinais de infecção ou deiscência da sutura, porém foram identificadas dificuldades na fala e na movimentação lingual, geradas pela cicatrização do ferimento, o que indicou a solicitação de avaliação e tratamento fonoaudiológico. A sutura por planos e os cuidados locais em ferimentos extensos ajudam a evitar complicações imediatas como a infecção ou deiscência da sutura e tardias geradas pela cicatrização inadequada.

Descritores: Língua; Ferimentos e Lesões; Técnicas de Fechamento de Ferimentos.