



LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE LESÕES CERVICAIS NÃO CARIOSAS EM ACADÊMICOS DE UMA FACULDADE PARTICULAR DE IMPERATRIZ – MA

Marina Nottingham Guerreiro, Raquel Adriano Dantas, Thâmara Thaís Lima Moraes, Henrique Caballero Steinhauser, Guilherme da Gama Ramos
guerreiriomarina@hotmail.com

Faculdade São Leopoldo Mandic, Mandic, Fortaleza-CE

Categoria: Pesquisa

Introdução: As lesões cervicais não cariosas (LCNCs) são perdas de tecido mineralizado na região cervical dos dentes afetados que não está relacionado com cárie dentária. Caracterizam-se por ocasionar hipersensibilidade dentinária expondo a dentina a estímulos térmicos, químicos, táteis e prejuízo estético ao paciente. **Objetivos:** Realizar um levantamento de dados de lesões cervicais não cariosas (LCNCs) em uma amostra de acadêmicos de uma faculdade de Imperatriz-MA. **Metodologia:** Trata-se de um estudo observacional transversal, com amostra composta por 120 acadêmicos do curso de Odontologia, de ambos os gêneros, com idade entre 18 e 40 anos, cursando do 4º ao 9º período da Faculdade de Imperatriz–Maranhão Facimp-Wyden. Os acadêmicos irão responder ao questionário com perguntas referentes à idade, gênero, problemas gastrointestinais, uso de medicação, hipersensibilidade dentinária e dieta. Na identificação de lesões cervicais, as faces vestibulares e linguais/palatinas dos dentes serão examinadas por sonda periodontal posicionada paralelamente ao longo eixo do dente. Os dentes com LCNC serão avaliados quanto à severidade, utilizando-se critérios que foram obtidos do trabalho de Aw et al. (2002), onde o autor categorizou a profundidade das lesões cervicais não cariosas em uma escala ordinal (de 1mm a 2mm de profundidade; de 2mm a 3mm; de 3mm a 4mm e maior que 4mm). **Resultados:** Dos acadêmicos analisados, houve uma prevalência de 55,8% com LCNCs, o sexo feminino foi o que apresentou maior quantidade de LCNCs 52,4%, o grupo dos pré-molares foi o mais afetado pelas LCNCs representado por 125 dos 180 dentes com LCNCs analisados, e 55,7% dos pacientes com hábitos parafuncionais apresentaram LCNCs. **Conclusão:** Conclui-se que a prevalência das LCNCs são nos dentes pré molares, o sexo feminino foi o que mais apresentou LCNCs, a superfície vestibular foi a mais acometida e lesões com profundidade rasas foram as mais observadas na amostra.

Descritores: Lesões Cervicais; Abrasão Dentária; Erosão Dentária.