



## **X Jornada Odontológica da Universidade Brasil**

*“Prof<sup>ª</sup>. Dr<sup>ª</sup>. Elisa Mattias Sartori”*

**27 a 31 de agosto de 2018**

Estrada Projetada F1, S/N - Fazenda Santa Rita

Fernandópolis - SP, 15600-000

DOI: <http://dx.doi.org/10.21270/archi.v7i0.3668>

### **PATOLOGIA DE GLÂNDULA SALIVAR: DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO**

Ana Rosa Herrera Braz, Andre Luis Fabris da Silva, Luciana Estevam Simonato

Universidade Brasil - Campus Fernandópolis, Fernandópolis-SP

**Categoria:** Oral

Sialolitíase é uma alteração que acomete as glândulas salivares decorrente da obstrução do ducto excretor ou da própria glândula. Sua etiologia ocorre devido a deposição de sais de cálcio ao redor do acúmulo de restos orgânicos, células epiteliais, bactérias e/ou corpos estranhos. A sialolitíase pode ocorrer em qualquer idade, sendo mais comum em jovens e adultos de meia idade. As glândulas salivares maiores apresentam-se com dor e/ou tumefação episódica, sendo que se o cálculo estiver na porção terminal do ducto pode-se palpar a massa dura abaixo da mucosa. Os exames radiográficos são muito importantes no auxílio do diagnóstico, devido a presença de massas radiopacas únicas ou múltiplas de formato variável. O tratamento envolve massagem, sialogogos, calor úmido, aumento de ingestão de líquidos e/ou remoção cirúrgica. O prognóstico é favorável. O presente trabalho apresentou um caso de sialolitíase em glândula submandibular direita, dando ênfase no diagnóstico e tratamento. Paciente sexo feminino, melanoderma, 55 anos de idade, fumante, procurou atendimento no (CEO) de Fernandópolis/SP, queixando-se de “caroço embaixo da língua”. Ao exame intrabucal observou-se um nódulo avermelhado em assoalho bucal do lado direito, duro a palpação, sugestivo à sialolitíase. Nas radiografias panorâmica e oclusal de mandíbula, não apresentaram alterações significativas. Realizou-se a ordenha da glândula expondo o sialolito na porção terminal do ducto da glândula. Com isso, optou-se pela remoção cirúrgica do mesmo. O material coletado foi encaminhado para análise histopatológica, que definiu o diagnóstico. Diante do caso relatado, concluiu-se que a sialolitíase apesar de ser comum nas glândulas salivares, é pouco discutida, sendo seu diagnóstico fundamental para um correto tratamento.

**Descritores:** Sialolitíase; Glândulas Salivares; Sialolito.