



## **X Jornada Odontológica da Universidade Brasil**

*“Prof<sup>a</sup>. Dr<sup>a</sup>. Elisa Mattias Sartori”*

**27 a 31 de agosto de 2018**

Estrada Projetada F1, S/N - Fazenda Santa Rita

Fernandópolis - SP, 15600-000

DOI: <http://dx.doi.org/10.21270/archi.v7i0.3668>

### **VERRUGA VULGAR EM LÁBIO INFERIOR – RELATO DE CASO**

Layni Andrade Basi, Angela Maria Laurindo Armelin, Yasmin Dutra, Lucieni Cristina Trovati Moretti, Karina Gonzalez Camara Fernandes, Saygo Tomo, Luciana Estevam Simonato  
Universidade Brasil - Campus Fernandópolis, Fernandópolis-SP

**Categoria:** Paineis

A verruga vulgar é uma hiperplasia focal benigna do epitélio escamoso estratificado induzida pelo papilomavírus humano (HPV). Esse vírus é capaz de tornar-se totalmente integrado ao DNA da célula hospedeira induzindo a proliferação epitelial. A verruga vulgar é contagiosa e pode disseminar-se para outras partes da pele ou das mucosas de um indivíduo por meio de autoinoculação, sendo frequentemente descoberta em crianças. Na mucosa oral as lesões podem ser encontradas no vermelhão do lábio, na mucosa labial e na língua; apresenta-se como uma pápula ou nódulo indolor, exibindo projeções papilares. Pode ser pedunculada ou séssil e de coloração esbranquiçada. Este trabalho objetivou relatar um caso clínico de verruga vulgar em paciente adulto. Paciente do gênero masculino, 63 anos de idade, leucoderma, tabagista, hipertenso, compareceu para atendimento ambulatorial em serviço de diagnóstico no Centro de Especialidades de Odontologia de Fernandópolis/SP com queixa principal de mancha na língua. Ao exame intrabucal foi observado uma lesão em lábio inferior do lado esquerdo, com base séssil, coloração esbranquiçada, indolor, sugerindo diagnóstico diferencial de leucoplasia. Foi realizada biópsia incisional e o exame histopatológico confirmou diagnóstico de verruga vulgar, já que a lâmina apresentava proliferação papilar e digitiforme do tecido epitelial hiperqueratinizado, sustentado por centros de tecido conjuntivo fibrovascular. Os colócitos também puderam ser encontrados devido a inclusão do HPV. Diante desse caso, pudemos concluir que apesar do acometimento da verruga ocorrer predominantemente em crianças, pode acometer em adultos, sendo fundamental que o cirurgião dentista realize a análise anatomopatológica para definição do diagnóstico e correta intervenção terapêutica.

**Descritores:** Verruga Vulgar; Papilomavírus Humano (HPV); Diagnóstico Bucal.