

## **INTERVENÇÃO ORTODÔNTICA EM CASO DE MORDIDA ABERTA ANTERIOR ASSOCIADA À SUÇÃO DE CHUPETA**

Inushi GAG, Terada HH, Xavier MCA, Zilioli TA

georgiaayu@gmail.com

Universidade Estadual de Ponta Grossa UEPG/Paraná, Brasil

**Categoria:** Caso Clínico

**Formato:** Apresentação Oral

**Justificativa:** As más oclusões apresentam alta prevalência dentro da população brasileira, sendo considerado um dos mais preocupantes problemas de saúde bucal no país. Dessa forma, ressalta-se a relevância da abordagem desse tema. **Objetivos:** Como um dos maiores exemplos de disfunção oclusal cita-se a mordida aberta anterior, caracterizada como uma anomalia multietiológica, e devido instabilidade e variação de características, acaba tendo seu tratamento dificultado. O propósito deste trabalho consiste justamente em abordar aspectos característicos da mordida aberta anterior, explicitado na apresentação de um caso clínico. **Relato de caso:** Paciente do sexo feminino em fase de crescimento (nove anos de idade), que apresentava tal disfunção, procurou atendimento odontológico com a queixa principal de irregularidade no alinhamento dentário. Nessa situação, a chupeta foi identificada como a principal causa do desenvolvimento da má oclusão, e optou-se por intervenção ortodôntica utilizando um expansor de maxila do tipo Hyrax e posteriormente placa com grade palatina removível. Devido colaboração da paciente, o tratamento odontológico teve duração de um período de aproximadamente um ano e meio, com acompanhamento mensal. Ao término, foi necessária intervenção da fonoaudiologia. **Resultados:** Com a finalização completa do quadro, pôde-se observar a correção da mordida aberta anterior, além de funções como deglutição, respiração e fonação normalizadas e estáveis, revelando exatidão no tratamento. **Conclusões:** A obtenção de resultados satisfatórios mostra a necessidade de um atendimento interdisciplinar e conjunto entre profissionais de diferentes áreas para a realização de um tratamento integral do paciente. Além disso, atribui-se importância a um diagnóstico precoce da mordida aberta anterior e a um início de intervenção logo na infância, de forma a apresentar maior sucesso se comparados a abordagens realizadas em pacientes adultos.

**Descritores:** Má Oclusão; Mordida Aberta; Ortodontia.