



DOI: <http://dx.doi.org/10.21270/archi.v7i0.3910>

ABORDAGEM CIRÚRGICA EM DENTE COM CALCIFICAÇÃO PULPAR E LESÃO PERIAPICAL: RELATO DE CASO

CAMACHO, L. C. (UNESP - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"); TRIZZI, J. Q. (UNESP - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"); SOUZA, Y. F. (UEM Universidade Estadual de Maringá); CINTRA, L. T. A. (UNESP - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"); GOMES-FILHO, J. E. (UNESP - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"); DEZAN JR, E. (UNESP - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"); SIVIERI-ARAÚJO, G. (UNESP - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"); PAVAN, N. N. O. (UEM - Universidade Estadual de Maringá)

Tema: Clínica Odontológica

As calcificações causam grande preocupação frente à dificuldade de tratamento pelos clínicos, que podem ser didaticamente divididas em verdadeiras e falsas. Em alguns casos pode-se verificar que a luz do canal apresenta-se totalmente obliterada na imagem radiográfica. O presente caso clínico relata um dente com calcificação pulpar e uma lesão periapical, onde houve a impossibilidade de ser tratado endodonticamente, e a cirurgia parendodôntica foi a forma de tratamento, frente a esta e outras complicações. M.V.A., gênero feminino, Leucoderma, 47 anos compareceu ao Hospital Universitário e apresentava-se sistemicamente saudável. Relatava dor à mastigação na região do dente 13 como queixa principal. Ao realizar o exame clínico constatou-se edema na região do nº13, apresentando resposta negativa ao teste de sensibilidade e resposta positiva ao teste de percussão. No exame radiográfico periapical cerificou-se câmara pulpar calcificada e então tentativa de localização do canal pelo acesso coronário. Em uma nova tomada radiográfica na residência de Endodontia pode-se observar que havia um desgaste excessivo e desvio na tentativa de encontrar o canal, uma vez que o paciente procurou uma clínica particular. E como tratamento proposto realizou-se uma cirurgia parendodôntica, com retropreparo com broca esférica e retrobturação com MTA, havendo assim, um controle após três meses e outro após um ano. Uma das grandes dificuldades de tratar um dente com calcificação pulpar, é que, a localização do canal radicular é dificultada. O uso de radiografias é de suma importância para o tratamento, pois além de dar um correto diagnóstico, nos ajuda a evitar perfurações, como visto no presente trabalho. Quando não se consegue acesso aos canais através do tratamento não cirúrgico, pode-se optar pelo tratamento cirúrgico (cirurgia parendodôntica).

Descritores: Parendodôntica; Calcificação Pulpar; Lesão Periapical.