



DOI: <http://dx.doi.org/10.21270/archi.v7i0.3910>

MANEJO DE TECIDOS MOLES EM ÁREA ESTÉTICA POST- EXODONTIA COM INSTALAÇÃO DE IMPLANTE TARDIO - RELATO DE CASO CLINICO

RAMOS, E. U. (UNESP - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"); BASTOS, L. G. C. (UFBA - Universidade Federal da Bahia); FREITAS, C. A. (UFBA - Universidade Federal da Bahia); BASSI, A. P. F. (UNESP - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"); SANTOS, F. L. M. (UFBA - Universidade Federal da Bahia)

Tema: Clínica Odontológica

O manejo dos tecidos moles é muito importante para uma melhor resolução estética dos casos. A instalação de implantes tardios após exodontia tem várias formas de abordagem e é dependente do grau do defeito do tecido ósseo e mole. Quando existe uma deiscência maior que 5 mm resultante de extração dental anterior, com um notável colapso dos tecidos mole e duro vestibulolingualmente, sem perda significativa da crista óssea, a Regeneração Óssea Guiada está indicada, com a instalação do implante tardio utilizando enxerto ósseo e membrana, e muitas vezes enxerto de tecido conjuntivo tornando o tratamento mais complexo e longo. A instalação tardia tem várias vantagens, a principal delas proporciona as condições adequadas para instalação do implante. O objetivo deste trabalho é relatar um caso clínico de uma paciente reabilitada com a instalação de implante tardio após exodontia, sem a necessidade de realizar enxerto de tecido conjuntivo, realizando condicionamento por acréscimo gradual do provisório de resina acrílica. Paciente do sexo feminino, compareceu ao consultório privado, com a finalidade de reabilitar a unidade 22, com fratura radicular. Foi então realizado a exodontia da unidade fraturada, com enxerto ósseo particulado mais membrana. Logo foi realizada a provisionalização com uma prótese parcial removível, com alívio total na região. O implante foi instalado após 6 meses, e sua reabertura foi feita após 4 meses realizando deslocamento de gengiva queratinizada para vestibular. Um provisório em resina acrílica foi utilizado para o condicionamento por acréscimo gradual, e finalmente a reabilitação final com uma coroa em zircônia cimentada. Baseada na revisão de literatura realizada e no caso clínico apresentado, o manejo dos tecidos moles após a instalação de implante tardio permite um melhor resultado estético quando criteriosamente planejado, mostrando que é um tratamento eficaz, seguro e com sucesso no resultado final.

Descritores: Prótese Dentária; Implantação Dentária; Planejamento de Prótese Dentária.