



DOI: <http://dx.doi.org/10.21270/archi.v7i0.3910>

PROTOCOLO DE BRÄNEMARK EM MANDÍBULA ASSOCIADO À PRÓTESE TOTAL CONVENCIONAL SUPERIOR - RELATO DE CASO CLÍNICO

AMARANTE, V. O. Z. (UNESP - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"); MACHADO, T. (UNESP - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"); OLIVA, A. H. (UNESP - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"); JUNGER, B. (UNESP - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"); FAVERANI, L. P. (UNESP - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"); ASSUNÇÃO, W. G. (UNESP - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho")

Tema: Clínica Odontológica

Os implantes ósseointegrados fomentou uma revolução na Odontologia, permitindo a reabilitação de pacientes tidos como inválidos orais a partir da utilização de próteses implantossuportadas devolvendo função, estética e autoestima ao paciente. Desta maneira, o presente trabalho visa discutir e refletir acerca da utilização da reabilitação com implantes a partir de um relato de caso. Paciente A. N., 62 anos, sexo masculino, feoderma, procurou a Faculdade de Odontologia de Araçatuba- Unesp, buscando reabilitação protética com queixa principal de mobilidade exagerada da prótese total inferior. O mesmo foi encaminhado para a instalação de implantes dentários. Na anamnese não foi detectada alteração que contraindicasse a cirurgia, solicitou-se radiografia panorâmica para avaliação de disponibilidade e altura óssea, além do planejamento cirúrgico e exames laboratoriais pré-operatórios. Durante a cirurgia, foram instalados 5 implantes de 3,75x15mm na região interforaminal da mandíbula, efetuada instalação de intermediários, sutura e moldagem para confecção protética. A prótese definitiva foi instalada e testes fonéticos e funcionais efetuados onde foi possível avaliar a boa execução da técnica. Podendo-se concluir que tal reabilitação com implantes do tipo protocolo de Bränemark com carga imediata é uma alternativa importante, onde a boa execução da técnica permite reestabelecimento estético e funcional efetivo, sendo ou não associada a prótese total convencional no arco antagonista.

Descritores: Implantes Dentários; Reabilitação; Branemark.