

Odontoma composto – relato de caso clínico

**Ramos, Adriano Peres Borges; Coclete, Gilberto Aparecido; Salzedas, Leda Maria
Pescinini; Carvalho, Antonio Augusto Ferreira; Paulon, Samuel Santos;
Coclete, Giovanna Elisa Gabriel**

Faculdade de Odontologia de Araçatuba – UNESP

Os odontomas são os tipos mais comuns de tumores odontogênicos, sendo sua constituição principalmente de esmalte e dentina, com quantidade variável de cimento e polpa. Apresenta relação com dentes inclusos e sua etiopatogenia é desconhecida. Radiograficamente pode ser classificado como composto ou complexo. Acomete com mais frequência pacientes entre a primeira e segunda década de vida, e não há predileção por sexo. Localiza-se principalmente em região anterior de maxila, assintomático e tem associação com dentes inclusos e supranumerários. Neste trabalho relatamos um caso clínico, cuja paciente foi encaminhada para avaliação devido a ausência do dente 33. O diagnóstico clínico-radiográfico inicial foi de odontoma composto. Realizou-se a remoção cirúrgica da lesão e do dente incluso tendo o exame histopatológico confirmado o diagnóstico de odontoma composto.

Referências

1. Neville.B.W.et al; Patologia Oral & Maxilofacial,2009,edit:guanabara koogan.
2. Tomasi,A.F.et.al;Diagnóstico em patologia bucal.,1982,edit:artes médicas.
3. Montebelo. F.A;Bóscolo,F.N;Gonçalves,A.;Gonçalves,M.